| REQUISITI FISICI DEL DONATORE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Sangue intero** | **Plasma** | **Piastrine** | **Donazione multicomponent (plasmapiastrino aferesi)** |
| **Età minima** | 18 anni | 18 anni | 18 anni | 18 anni |
| **Età massima** | 60 per il nuovo donatore<br>65 per il donatore periodico[nota1] | 60 anni | 60 anni | 60 anni |
| **Peso minimo** | 50 Kg | 50 Kg | 50 Kg | 50 Kg |
| **Frequenza cardiaca** | Regolare compresa tra 50 e 100 battiti/min<br>Frequenze inferiori possono essere accettate nei donatori che praticano attività sportiva agonistica o intensa | | | |
| **Pressione** | Sistolica: inferiore o uguale a 180 mm Hg.<br>Diastolica: inferiore o uguale a 100 mm Hg. | | | |
| **Emoglobina predonazione** | ≥ 12,5g/dL nella donna<br>≥ 13,5 g/dL nell'uomo | ≥12,5g/dL nella donna<br>≥ 13,5 g/dL nell'uomo[nota2] | ≥ 12,5g/dL nella donna<br>≥ 13,5 g/dL nell'uomo | ≥ 12,5g/dL nella donna<br>≥ 13,5 g/dL nell'uomo |
| **Conta Piastrinica predonazione** | | > 180.000/mmc.<br>In caso di donazione di due unità di concentrato piastrinico, la conta piastrinica non deve essere inferiore a 200.000/mmc | | |
| **Altri Esami** | | -Protidemia > 6g/dL<br>-Elettroforesi normale<br>-PT e PTT nella norma | | |
| **Quantità** | 450 ml<br>Eccezionalmente, in casi particolari e motivati, è possibile accettare uno scostamento del 10% del volume | Volume minimo: 600 ml<br>Volume massimo: 700 ml<br>Con un volume massimo complessivo di 1,5 litri al mese 12 litri nell'anno | Volume adeguato a contenere un minimo di $3,0 \times 10^{11}$ piastrine per unità | 700 ml (volume complessivo degli emocomponenti raccolti).<br>Volume di plasma non inferiore a 450 ml<br>e<br>una unità di concentrato piastrinico contenente almeno $2,0 \times 10^{11}$ piastrine |

**Nota 1** A giudizio del medico responsabile della selezione può essere autorizzata la donazione di sangue intero da parte di soggetti di età superiore ai 65 anni e comunque fino ad un massimo di 70 anni, in tal caso è richiesto ECG e visita cardiologica annuale ed esecuzione di Rx torace ogni due anni

**Nota 2** Per plasmaferesi occasionali, attuate con intervalli di tempo superiore a 90 giorni, sono accettabili anche valori minimi di:
- Hb ≥11,5g/dL nella donna e ≥ 12,5 g/dL nell'uomo
- Hb ≥11 g/dL nella donna e ≥ 12 g/dL nell'uomo se portatori di trait talassemico

| *INTERVALLO DI TEMPO MINIMO TRA LE DONAZIONI E NUMERO MASSIMO DI DONAZIONI* | | |
|---|---|---|
| *TIPOLOGIA DI DONAZIONE* | *INTERVALLO MINIMO* | *NUMERO MASSIMO DI DONAZIONI/ANNO* |
| Tra due donazioni di sangue intero | 90 giorni | Il numero massimo di donazioni di sangue intero non deve essere superiore a:<br>- 4 per l'uomo e per la donna non in età fertile<br>- 2 per la donna in età fertile |
| Tra una donazione di plasma e una di sangue intero o citoaferesi | 14 giorni<br>(consigliato un mese) | |
| Tra una donazione di sangue intero o citoaferesi ed una di plasma | 30 giorni | |
| Tra due donazioni di piastrinoaferesi | 14 giorni<br>(consigliato due mesi) | 6 piastrinoaferesi |
| Tra due donazioni di plasmaferesi | 14 giorni<br>(consigliato un mese)<br>Per plasmaferesi occasionali, attuate con intervalli di tempo superiore a 90 giorni, sono accettabili anche valori minimi di:<br>Hb $\geq$ 11,5g/dL nella donna<br>e $\geq$ 12,5 g/dL nell'uomo<br><br>Hb $\geq$ 11 g/dL nella donna e Hb$\geq$12 g/dL nell'uomo se portatori di trait talassemico | 1,5 litri al mese<br>12 litri nell'anno |
| Tra una donazione di citoaferesi ed una di sangue intero | 14 giorni<br>(consigliato un mese) | |
| Tra una donazione di sangue intero<br>ed una piastrinoaferesi | 30 giorni | |
| Tra due plasmapiastrinoaferesi | 14 giorni<br>(consigliato un mese) | 6 plasmapiastrinoaferesi |
| Tra una donazione di globuli rossi ed una plasmapiastrinoaferesi | 30 giorni | |
| Tra due donazioni di piastrine in aferesi in sacca doppia | 30 giorni | 3 donazioni di doppia dose di piastrine da aferesi |

| ESAMI PREVISTI ALL'AMMISSIONE DELL'ASPIRANTE DONATORE |
|---|
| Anticorpi anti-HCV |
| HBsAg |
| Anticorpi anti-HBc |
| Anticorpi anti- HIV 1-2 e antigene HIV |
| Anticorpi anti-Treponema Pallidum |
| Esame Emocromocitometrico completo |
| Alanin-amino-transferasi |
| Ferritinemia |
| Glicemia |
| Creatininemia |
| Trigliceridemia |
| Colesterolemia totale e HDL |
| Proteinemia totale |
| Fenotipo ABO |
| Fenotipo Rh completo |
| Sistema Kell e in caso di positività dello stesso, ricerca dell'antigene Cellano |
| Ricerca Anticorpi irregolari |

| ESAMI OBBLIGATORI AD OGNI DONAZIONE |
|---|
| Anticorpi anti-HCV |
| HBsAg |
| Anticorpi anti- HIV 1-2 e antigene HIV |
| Anticorpi anti-Treponema Pallidum |
| HIV NAT |
| HCV NAT |
| HBV NAT |
| WNV NAT (nel periodo di comprovata circolazione del virus) |
| Esame Emocromocitometrico completo |
| Fenotipo ABO (solo test diretto) e Rh (D) |

| CONTROLLO ANNUALE |
|---|
| Alanin-amino-transferasi |
| Ferritinemia |
| Glicemia |
| Creatininemia |
| Trigliceridemia |
| Colesterolemia totale e HDL |
| Proteinemia totale |
| Ricerca anticorpi irregolari |

**Elettrocardiogramma**

Il controllo ECG è previsto nelle seguenti condizioni :

- Aspirante donatore / 1ª donazione
- Secondo valutazione medica

| | |
|---|---|
| *Occupazioni pericolose* | Non deve essere ammesso alla donazione chi nelle 24 ore successive alla donazione svolge attività rischiose. (Per es.: conducenti di treno, autobus, gru, minatori, persone che lavorano su impalcature, che si arrampicano, sommozzatori.) |
| *Hobby pericolosi* | Non deve essere ammesso alla donazione chi nelle 24 ore successive alla donazione svolge attività sportive rischiose. (Per es.:volo in deltaplano, ascensioni in montagna, immersioni, automobilismo e motociclismo sportivi) |
| *Digiuno* | Il digiuno prima del salasso non è strettamente necessario, può quindi essere ammessa una leggera colazione (caffè e the poco zuccherati, non latte e derivati) |

## CRITERI PER LA SELEZIONE DEL DONATORE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

| MALATTIE ALLERGICHE | |
|---|---|
| **Allergie asintomatiche** | Idoneo |
| **Allergia sintomatiche** | Sospensione temporanea per tutto il periodo sintomatico |
| **Manifestazioni allergiche gravi a sostanze con particolare riguardo alla penicillina, a cefalosporine, al veleno di imenotteri,** | Sospensione per 2 mesi dopo l'ultima esposizione |
| **Shock anafilattico** | Esclusione |
| **Terapia desensibilizzante** | Sospensione per 72 ore dall'ultima iniezione |
| **Malattia Celiaca** | Idoneo purchè il donatore segua una dieta priva di glutine |
| **Asma allergico** | Esclusione se sintomatico e in terapia.<br>Idoneo solo se è senza terapia e non è più sintomatico |
| **Allergia o intolleranza al citrato** | Non idoneo alla donazione in aferesi |

| MALATTIE AUTOIMMUNI | |
|---|---|
| **Malattia autoimmunitaria che coinvolge più organi o anche monorgano se candidati a procedure che prevedano la somministrazione di fattori di crescita** | Esclusione |
| **Tiroidite autoimmune stabilmente compensata in terapia sostitutiva** | Idoneo previa valutazione medica |

| MALATTIE NEUROLOGICHE | |
|---|---|
| **Epilessia e convulsioni in età adulta** | Esclusione |
| **Convulsioni febbrili in età infantile senza esiti** | Idoneo |
| **Sincope** | Esclusione |
| **Neuropatie sistemiche** | Esclusione |
| **Patologia degenerativa o vascolare del SNC** | Esclusione |
| **Psicosi/demenza/nevrosi grave** | Esclusione |
| **Neurochirurgia del Sistema Nervoso Centrale** | Esclusione |
| **Meningite anamnestica senza esiti** | Idoneo |
| **Meningite acuta** | Sospensione fino ad un anno dalla guarigione completa e senza reliquati e riammissione previa valutazione specialistica |
| **Vertigini e/o labirintiti** | Sospensione temporanea sino a risoluzione |
| **Trauma cranico. Profilassi con farmaci anticomiziali in assenza di accessi epilettici** | Sospensione e riammissione, in caso di *restitutio ad integrum* previa valutazione medica dopo la fine della profilassi |

| MALATTIE CARDIOVASCOLARI | |
|---|---|
| **Coronaropatie, angina pectoris, cardiopatie, aritmie gravi, vasculopatie gravi, trombosi venose e arteriose ricorrenti** | Esclusione |
| **Anomalie congenite completamente guarite o corrette (es correzione forame ovale pervio)** | Valutazione caso per caso con accertamenti clinici e strumentali.<br>Idoneo se senza esiti e non in terapia |
| **Anomalie elettrocardiogragiche** | Sospensione fino alla valutazione caso per caso con accertamenti clinici e strumentali |
| **Ipertensione arteriosa** | Idoneo a condizione che non ci siano lesioni d'organo (es retinopatia di II grado associata a ipertrofia ventricolare sinistra) |

| MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO | |
|---|---|
| **Colite Ulcerosa** | Esclusione |
| **Malattia di Crohn** | Esclusione |
| **Ulcera peptica in fase attiva** | Sospensione fino a guarigione documentata |

| AFFEZIONI RESPIRATORIE | |
|---|---|
| **Broncopneumopatia acuta** | Sospensione per 1 mese dalla cessazione dei sintomi e/o della terapia |
| **Broncopneumopatia grave attiva cronica e recidivante o in presenza di danni d'organo causati dall'affezione respiratoria** | Esclusione |
| **Sarcoidosi** | Esclusione |
| **Pneumotorace** | Esclusione temporanea per 4 mesi dalla guarigione previa valutazione specialistica |

| AFFEZIONI RENALI | |
|---|---|
| **Nefropatia grave attiva cronica e recidivante o in presenza di danni d'organo causati dall'affezione renale** | Esclusione permanente |
| **Glomerulonefrite acuta** | Sospensione per 5 anni dalla guarigione completa |

| AFFEZIONI UROGENITALI | |
|---|---|
| **Affezione urogenitale grave attiva cronica e recidivante o in presenza di danni d'organo causati dalla stessa** | Esclusione permanente |

| ENDOCRINOPATIE | |
|---|---|
| **Malattie della tiroide, malattie del surrene, malattie del pancreas, malattie dell'ipofisi** | Per ciascuna di tali patologie:<br>• esclusione in caso di patologie neoplastiche maligne<br>• valutazione caso per caso in presenza di patologie neoplastiche benigne<br>• sospensione temporanea in caso di patologie infiammatorie, fino a guarigione senza reliquati<br>• idoneo in caso di Ipotiroidismo ben compensato in terapia sostitutiva continua |
| **Diabete** | • Esclusione se in trattamento insulinico<br>• Valutazione caso per caso se diabete compensato che non richiede trattamento insulinico e in assenza di danni d'organo |

| MALATTIE EMATOLOGICHE | |
|---|---|
| **Affezioni ematologiche gravi attive croniche e recidivanti** | Esclusione |
| **Anemia** | Sospensione fino alla definizione della causa; quindi valutazione caso per caso |
| **Portatori eterozigoti di trait beta o alfa talassemico** | Idoneità condizionata a livelli accettabili di emoglobina |
| **Diatesi emorragiche** | Esclusione |
| **Coagulopatia su base congenita o acquisita** | Esclusione |

| EMOCROMATOSI |
|---|
| I soggetti rilevati portatori di emocromatosi, con documentazione clinica di assenza di danno d'organo, possono essere accettati per la donazione di sangue intero.<br>Il numero di donazioni nell'anno non deve essere superiore a 4 per l'uomo e per la donna non in età fertile, a 2 per la donna in età fertile |

| MALATTIE INFETTIVE | |
|---|---|
| **Epatite B,**<br>**Epatite C,**<br>**Infezione da HIV**<br>**Infezione da HTLV I/II**<br>**Malattia di Chagas o Tripanosomiasi americana**<br>**Babesiosi**<br>**Lebbra**<br>**Kala Azar (Leishmaniosi viscerale)**<br>**Sifilide**<br>**Febbre Q cronica** | Esclusione |
| **Glomerulonefrite acuta** | 5 anni dalla completa guarigione |
| **Brucellosi** | 2 anni dalla completa guarigione |
| **Osteomielite** | 2 anni dalla completa guarigione |
| **Febbre Q** | 2 anni dalla completa guarigione |
| **TBC** | 2 anni dalla completa guarigione |
| **Febbre Reumatica** | 2 anni dalla guarigione, a meno che non si instaurino complicazioni cardiache o renali con esiti permanenti, in questi casi esclusione |
| **Malattia di Lyme** | 12 mesi dopo la guarigione |
| **Toxoplasmosi** | 6 mesi dalla completa guarigione |
| **Mononucleosi infettiva** | 6 mesi dalla completa guarigione |
| **Infezione accertata da CMV** | 6 mesi dalla completa guarigione |
| **Affezioni di tipo influenzale** | Sospensione per 2 settimane dopo la cessazione dei sintomi |
| **Febbre > 38°** | Sospensione per 2 settimane dopo la cessazione dei sintomi |
| **Puntura di zecca** | Sospensione per 3 mesi, in assenza di malattia clinicamente evidente |
| **Virus erpetici** | Sospensione fino a guarigione delle lesioni -formazione della crosta- (Herpes simplex).<br>Sospensione fino a 2 settimane dopo la guarigione (Herpes zoster) |

| | |
|---|---|
| **Altre malattie infettive** | Sospensione per 2 settimane dalla completa guarigione in assenza di terapia |
| **Situazioni epidemiologiche particolari (ad es focolai di malattie)** | Esclusione conforme alla situazione epidemiologica |

| **MALATTIA DI CHAGAS O TRIPANOSOMIASI AMERICANA** |
|---|
| I soggetti nati (o con madre nata) in Paesi dove la malattia è endemica, o che sono stati trasfusi in tali Paesi, o che hanno viaggiato in aree a rischio (rurali) e soggiornato in condizioni ambientali favorenti l'infezione (camping, trekking) possono essere ammessi alla donazione solo in presenza di un test per anticorpi anti-Tripanosoma Cruzii negativo. |

| **MALARIA** | |
|---|---|
| **Soggetti che hanno vissuto per un periodo di 6 mesi o più (continuativi) in zona endemica in qualsiasi momento della loro vita** | Questi soggetti non possono donare fino a quando non venga effettuato uno specifico test immunologico, con esito negativo, in quanto a rischio di essere diventati portatori asintomatici del parassita malarico:<br>• devono essere sospesi dalle donazioni per almeno 6 mesi dall'ultimo soggiorno di qualsiasi durata in zona ad endemia malarica;<br>• possono essere accettati come donatori se risulta negativo un test immunologico per la ricerca di anticorpi anti-malarici, eseguito almeno 6 mesi dopo l'ultima visita in area ad endemia malarica;<br>• se il test risulta ripetutamente reattivo, il donatore è sospeso per 3 anni; successivamente può essere rivalutato, e accettato per la donazione se il test risulta negativo |
| **Soggetti che hanno sofferto di malaria, soggetti che hanno sofferto di episodi febbrili non diagnosticati compatibili con la diagnosi di malaria, durante un soggiorno in area ad endemia malarica o nei 6 mesi successivi al rientro** | • devono essere sospesi dalle donazioni per almeno 6 mesi dalla cessazione dei sintomi e dalla sospensione della terapia;<br>• possono essere accettati come donatori se risulta negativo un test immunologico per la ricerca di anticorpi anti-malarici, eseguito almeno 6 mesi dopo la cessazione dei sintomi e la sospensione della terapia;<br>• se il test risulta ripetutamente reattivo, il donatore è sospeso per 3 anni; successivamente può essere rivalutato, e accettato per la donazione se il test risulta negativo |
| **Soggetti che hanno visitato un'area ad endemia malarica e che non hanno sofferto di episodi febbrili o di altra sintomatologia compatibile con la diagnosi di malaria durante il soggiorno o nei 6 mesi successivi al rientro** | • possono essere accettati come donatori se sono passati almeno 6 mesi dall'ultima visita in un'area ad endemia malarica, e se risultano negativi a un test immunologico per la ricerca di anticorpi anti-malarici;<br>• se il test risulta ripetutamente reattivo, il donatore è sospeso per 3 anni; successivamente |

| | |
|---|---|
| | può essere rivalutato e accettato per la donazione se il test risulta negativo;<br>• se il test non viene effettuato, il soggetto può donare se sono passati almeno 12 mesi dall'ultima visita in un'area ad endemia malarica. |
| **I criteri inerenti il test per la ricerca di anticorpi anti-malarici e i periodi di sospensione sopra enunciati si applicano in caso di donazione di emocomponenti cellulari e plasma per uso clinico; possono essere evitati in caso di donazione di solo plasma da avviare alla produzione industriale di farmaci emoderivati.** | |

| **ENCEFALOPATIA SPONGIFORME (TSE)<br>MALATTIA DI CREUTZFELD - JAKOB, VARIANTE DELLA MALATTIA DI CREUTZFELDT-JAKOB** |
|---|
| Sono permanentemente esclusi :<br>• i soggetti che hanno ricevuto trapianto di cornea, sclera o dura madre, o che sono stati trattati con estratti della ghiandola pituitaria, o con antecedenti medici o familiari che comportano un rischio di contrarre TSE (demenza a rapida progressione, malattie neurologiche degenerative comprese le patologie di origine sconosciuta);<br>• i soggetti che hanno soggiornato per più di sei mesi cumulativi nel Regno Unito nel periodo 1980-1996;<br>• i soggetti che hanno subito intervento chirurgico o trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati nel Regno Unito dal 1980 al 1996. |

| **VIRUS DEL NILO OCCIDENTALE (WNV)** |
|---|
| • 28 giorni, dopo aver soggiornato almeno una notte, un'area a rischio per l'infezione da virus del Nilo occidentale documentato attraverso idonei sistemi di sorveglianza epidemiologica. L'esclusione temporanea non si applica nel caso in cui sia eseguito, con esito negativo, il test dell'acido nucleico (NAT), in singolo.<br><br>• 4 mesi dalla completa guarigione in caso di soggetto con diagnosi di infezione |

| **VIAGGI** | |
|---|---|
| **Soggiorno in paesi tropicali** | 6 mesi dal rientro; valutare lo stato di salute del donatore con particolare attenzione ad episodi febbrili dopo il rientro, e le condizioni igienico-sanitarie ed epidemiologiche della zona in causa. |
| **Soggiorno in paesi al di fuori delle aree tropicali, dove è segnalata la presenza di malattie tropicali** | si applica un periodo di sospensione stabilito sulla base della specifica malattia infettiva presente |
| **Soggiorno in paesi extraeuropei in zone endemiche per malattie infettive (es epatite A)** | 3 mesi dal rientro |

| NEOPLASIE | |
|---|---|
| **Neoplasie maligne, neoplasie ematologiche, neoplasie associate a condizioni viremiche** | Esclusione |
| **Soggetti con storia di carcinoma basocellulare o carcinoma in situ della cervice uterina dopo la rimozione della neoplasia** | Sospensione per un anno.<br>Riammissione previa valutazione specialistica attestante la completa guarigione |

| CURE ODONTOIATRICHE | |
|---|---|
| **cure di minore entità da parte di odontoiatra o odonto-igienista** | Sospensione per 48 ore |
| **Estrazioni dentarie devitalizzazione ed altri interventi (es. implantologia) assimilabili ad interventi chirurgici minori.** | Sospensione per una settimana dalla completa guarigione clinica |
| **Innesto di tessuto osseo autologo o omologo** | Sospensione per 4 mesi |

| INTERVENTI CHIRURGICI | |
|---|---|
| **Interventi di superficie (asportazione di verruche, ...)** | Sospensione per una settimana e fino a guarigione della ferita. |
| **Interventi medi**<br>- cutanei: asportazione lipomi, nevi, cisti …<br>- oculistici: miopia, cataratta…<br>- genitali: fimosi, circoncisione, vasectomia…<br>- ortopedici: tunnel carpale, morbo di De Quervain, dito a scatto, neuroma di Morton… | Sospensione per 1 mese dall'intervento.<br><br>Se intervento con esame istologico, la riammissione è subordinata alla valutazione del referto istologico. |
| **Interventi di rilievo**<br>- interventi addominali (colecistectomia, appendicectomia, isterectomia…)<br>- interventi toracici<br>- interventi ortopedici (protesi, fratture…)<br>- trapianti di cellule o tessuti omologhi, allograft da cadavere o da vivente, (eccetto cornea, sclera, dura madre): cute, osso, legamenti…<br>- interventi neurochirurgici (ernie iscali…)<br>- interventi vascolari (safenectomia, vene varicose…)<br>- interventi odontoiatrici: innesto di tessuto osseo autologo o omologo, xenoinnesti (osso bovino o equino)<br>- interventi in endoscopia (meniscectomia …)<br>- interventi che prevedono l'utilizzo di emocomponenti per uso topico (gel piastrinico…) | Sospensione per almeno 4 mesi dall'intervento. |
| Donazione di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche | Sospensione per un anno. |

| SOSTANZE FARMCOLOGICHE |
|---|
| Sono esclusi permanentemente i soggetti con uso attuale o pregresso non prescritto di sostanze farmacologiche o principi attivi, comprese sostanze stupefacenti, steroidi od ormoni a scopo di attività sportive, per via intramuscolare (IM), endovenosa (EV) o tramite strumenti in grado di trasmettere malattie infettive. |

| ASSUNZIONE DI FARMACI |
|---|
| Rinvio per un periodo variabile di tempo secondo il principio attivo dei medicinali prescritti, la farmacocinetica e la malattia oggetto di cura.<br>Per i soggetti che assumono farmaci a dimostrato effetto teratogeno, la sospensione dovrebbe essere protratta per un periodo adeguato in rapporto alle proprietà farmacocinetiche del farmaco stesso |

| TRASFUSIONI | |
|---|---|
| **Trasfusione di emocomponenti** | Sospensione per 4 mesi |
| **Somministrazione di emoderivati** | |

| TRAPIANTI | |
|---|---|
| **Trapianti d'organo** | Esclusione permanente |
| **Trapianto di CSE** | |
| **Trapianto di cornea, sclera o dura madre** | |
| **Xenotrapianti** | Sono esclusi tutti i soggetti che hanno ricevuto uno xenotrapianto. Non si applica all'utilizzo di preparati ossei/tissutali di origine animale all'uopo autorizzati e, laddove è previsto, certificati esenti da BSE, da parte delle autorità competenti |
| **Trapianti di tessuti o cellule di origine umana** | Sospensione per 4 mesi |

| CONDIZIONI A RISCHIO DI CONTRARRE UN'INFEZIONE TRASMISSIBILE CON IL SANGUE | |
|---|---|
| **Esame endoscopico con strumenti flessibili** | 4 mesi dall'ultima esposizione alla condizione di rischio. |
| **Spruzzo delle mucose con sangue o lesioni da ago** | |
| **Tatuaggi o body piercing** | |
| **Foratura delle orecchie** | |
| **Agopuntura, se non eseguita da professionisti qualificati con ago usa e getta** | |

| CONVIVENZA A RISCHIO | |
|---|---|
| **Convivenza con soggetto, non partner sessuale, con positività per HBsAg e/o anti HCV** | Sospensione fino a 4 mesi dopo la cessazione della convivenza.<br>Si applica anche se il donatore è vaccinato per l'epatite B. |

| COMPORTAMENTI SESSUALI A RISCHIO | |
|---|---|
| **Rapporti eterosessuali/omosessuali/ bisessuali con:**<br>• **partner risultato positivo ai test per l'epatite B e/o C e/o per l'AIDS o a rischio di esserlo**<br>• **partner che ha avuto precedenti comportamenti sessuali a rischio o del quale il donatore ignora le abitudini sessuali**<br>• **partner occasionale**<br>• **più partner sessuali**<br>• **soggetti tossicodipendenti**<br>• **con scambio di denaro e droga**<br>• **partner, di cui non sia noto lo stato sierologico, nato o proveniente da paesi esteri dove l'AIDS è una malattia diffusa** | 4 mesi dall'ultima esposizione ad una o più delle<br>condizioni di rischio |
| **Comportamento sessuale abituale e reiterato (promiscuità, occasionalità, rapporti sessuali con scambio di denaro o droga) che espone ad elevato rischio di contrarre malattie infettive trasmissibili con il sangue.** | Esclusione |

| FRATTURE |
|---|
| Sospensione fino a guarigione clinica e alla rimozione dell'eventuale apparecchio gessato. |

| ALCOLISMO CRONICO |
|---|
| **Esclusione** |

| GRAVIDANZA |
|---|
| • Durante la gravidanza<br>• 6 mesi dopo il parto o l'interruzione di gravidanza eccettuate circostanze particolari e a discrezione del medico che effettua la selezione. |

| VACCINAZIONI | |
|---|---|
| **Virus o batteri vivi attenuati** | 4 settimane |
| **Virus, batteri o rickettsie** | 48 ore se il soggetto è asintomatico |
| **Tossoidi** | 48 ore se il soggetto è asintomatico |
| **Vaccino dell'Epatite B** | 7 giorni se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione |
| **Vaccino dell'Epatite A** | 48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi e' stata esposizione |
| **Rabbia** | • 48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi e' stata esposizione<br>• 1 anno se il vaccino è stato somministrato dopo l'esposizione |
| **Vaccini dell'encefalite da zecche** | Nessuna esclusione se il soggetto sta bene e se non vi è stata esposizione |

| PRESENZA DI ANTICORPI IRREGOLARI |
|---|
| **Esclusione** |